SK-227

## iVC リンクルアイクリーム



## 〈ビタミン C 誘導体 & 高分子コラーゲン配合〉

目元のシワ用スポットケア

のびの良い固めのクリーム

Α	Vistanol GDHR ステアリルアルコール ベヘニルアルコール ステアリン酸グリセリル ステアリン酸 PEG-40 スクワラン ジメチコン ワセリン ステアリン酸 ミツロウ	4.0% 2.0% 2.0% 2.5% 1.5% 2.0% 1.0% 1.0% 2.0%
В	euxyl pe 9010 preservative BG キサンタンガム クエン酸バッファー (pH 4.5) 水	0.5% 5.0% 0.2% 1.0% Up to 100%
С	Amitose 3GA Promois W-52U ピロ亜硫酸 Na	<b>6.7% 2.0%</b> 0.05%

: 4.0-5.0 (25°C) pН

粘度 : 40,000-60,000 mPa · s (25℃、Brookfield No.4、6 rpm)

安定性 :2ヶ月(0℃、25℃、50℃)

## 製法 (1 kg スケール)

- 1) A と B を別容器で 80℃に加温する。
- 2) Bをホモミキサー 5,000 rpmで撹拌しながら、Aを少しずつ添加後、 9,000 rpmで 1 分撹拌する。
- 3) 氷水で急冷する。 4) 3) に C を添加後、ディスパーミキサー 5,000 rpmで 1 分撹拌する。